

- **Classification des bassins féminins**

	Bassin normal	Bassin limite	Bassin chirurgical
Diamètre promonto rétopubien	≥ 105 mm	Entre 105 et 85 mm	< 85 mm
Transverse médianⁱ	≥ 115 mm	Entre 115 et 95 mm	< 95 mm
Diamètre bisciatiqueⁱⁱ	≥ 95 mm	Entre 95 et 80 mm	< 80 mm
Diamètre bi-isciatique	≥ 90 mm	Entre 90 et 80 mm	< 80 mm
Indice de Magninⁱⁱⁱ	≥ 220 mm	Entre 220 et 200 mm	< 200 mm

ENC2 images x2 du bassin page 109 (attention correction nécessaire de ce qui est écrit en rouge)

ENC2 image du bassin page 110

- **Indications de radiopelvimétrie** : les indications sont de plus en plus limitées et dépendent souvent des habitudes de service.

Facteurs maternels	Facteurs fœtaux
Antécédent de césarienne pour stagnation de dilatation ou défaut d'engagement	Présentation en siège
Taille inférieur à 1m55	Grossesse gémellaire
Antécédent de traumatisme du bassin	Macrosomie fœtale suspectée
Anomalie de la statique rachidienne	
Bassin rétréci au toucher vaginal	
Rachitisme	
Boiterie	
Malformation des hanches	

ENC2 images x 3 du bassin page 114 avec le premier paragraphe seulement

ⁱ Egalement appelé transverse utile

ⁱⁱ Egalement appelé diamètre bi-épineux

ⁱⁱⁱ Indice de Magnin = Promonto rétopubien + transverse médian