

Classification clinique de la FIGO du cancer du col utérin  
Recommandations de l'HAS et de l'INCa, Janvier 2010

Stade I

Localisation strictement limitée au col	
Stade IA	carcinome micro-invasif non visible macroscopiquement, diagnostiqué à l'examen histologique (microscope)
IA1	envahissement du chorion de 3 mm ou moins, largeur de 7 mm ou moins
IA2	envahissement du chorion supérieur à 3 mm et < 5mm, largeur de 7 mm ou moins
Stade IB	cancer visible à l'examen clinique ou de taille supérieure à celle du IA2
IB1	lésion de 4 cm ou moins de diamètre maximal
IB2	lésion de plus de 4 cm de diamètre maximal

Stade II

Cancer étendu au delà du col mais n'atteignant pas la paroi pelvienne ni le tiers inférieur du vagin	
Stade IIA	extension vaginale sans atteinte des paramètres
IIA1	lésion de 4 cm ou moins de diamètre maximal
IIA2	lésion de plus de 4 cm de diamètre maximal
Stade IIB	extension vaginale avec atteinte d'au moins un des paramètres

Stade III

Cancer étendu à la paroi pelvienne et/ou au tiers inférieur du vagin et/ou responsable d'une hydronéphrose ou d'un rein muet	
Stade IIIA	cancer étendu au tiers inférieur du vagin sans atteinte des parois pelviennes
Stade IIIB	cancer étendu aux parois pelviennes et/ou responsable d'une hydronéphrose ou d'un rein muet

Stade IV

Invasion de la vessie, du rectum et au-delà de la cavité pelvienne	
Stade IVA	extension à la muqueuse vésicale et/ou à la muqueuse rectale
Stade IVB	métastases à distance (cavité péritonéale, foie, poumons et autres)

## Survie relative à 5 ans en fonction du stade

Stade	Survie relative à 5 ans
I	84 à 93 %
II	73 à 75 %
III	59 à 68 %
IV	35 %